

Таблиця 3. Список домінантів (*Д*) та субдомінантів (*С*) фітопланктону, мікрофітобентосу і фітоепіфітону Канівського водосховища за чисельністю (*N*) та біомасою (*B*) у біотопах у літні періоди 2017–2022 рр.

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		$\% N$ (<i>N</i> , тис. кл/дм ³)		$\% B$ (<i>B</i> , г/м ³)		$\% N$ (<i>N</i> , тис. кл/10 см ²)		$\% B$ (<i>B</i> , мг/10 см ²)	
		<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>
<i>Anagnostidinema amphibium</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	61% (8466)	–	10% (0,169)	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Aphanizomenon flos-aquae</i>	1	94% (116675)	7–9% (1143) (288)	74% (8,634)	5% (0,085)	–	–	–	–
	2	22% (269)	–	25% (0,040)	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Coelomoron pusillum</i>	1	–	–	–	–	–	7% (560)	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Coelosphaerium kuetzingianum</i>	1	29–50% (8975) (2100)	–	18% (0,296)	5% (0,069)	–	5% (2080)	–	–
	2	–	5% (144)	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		<u>% N</u> (N, тис. кл/дм ³)		<u>% B</u> (B, г/м ³)		<u>% N</u> (N, тис. кл/10 см ²)		<u>% B</u> (B, мг/10 см ²)	
		Д	С	Д	С	Д	С	Д	С
<i>Dolichospermum flos-aquae</i>	1	–	<u>5–9%</u> (900) (7684)	<u>13%</u> (1,383)	<u>5–7%</u> (0,085) (0,365)	–	<u>5%</u> (950)	–	–
	2	–	<u>9%</u> (600)	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Heteroleibleinia kuetzingii</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	<u>5%</u> (102)	–	–	–	–	–	–
	3	–	<u>6%</u> (10)	–	–	–	–	–	–
<i>Homeothrix sp.</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	<u>8%</u> (14)	–	–	–	–	–	–
<i>Leptolyngbya valderiana</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	<u>18%</u> (218)	–	–	<u>5%</u> (0,008)	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Limnothrix planctonica</i>	1	–	<u>9%</u> (2016)	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Merismopedia minima</i>	1	<u>32%</u> (10000)	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	<u>12%</u> (21)	–	–	–	–	–	–	–

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		<u>% N</u> (N, тис. кл/дм ³)		<u>% B</u> (B, г/м ³)		<u>% N</u> (N, тис. кл/10 см ²)		<u>% B</u> (B, мг/10 см ²)	
		<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>
<i>Merismopedia tenuissima</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	<u>10%</u> (65)	—	—	—
<i>Merismopedia tranquilla</i>	1	—	—	<u>8%</u> (0,140)	—	<u>40%</u> (16224)	—	<u>13%</u> (0,227)	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Microcoleus amoenus</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	<u>13%</u> (544)	—	—	<u>5%</u> (0,064)
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Microcrocis irregularis</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	<u>18%</u> (1250)	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Microcystis aeruginosa</i>	1	<u>14–74%</u> (1868) (1858)	<u>5%</u> (4448)	<u>13–71%</u> (0,211) (2,096)	<u>5%</u> (0,507)	<u>37%</u> (2790)	—	<u>14%</u> (0,315)	—
	2	—	<u>5–6%</u> (102) (170)	—	—	<u>36%</u> (1496)	—	<u>14%</u> (0,169)	—
	3	—	—	—	—	<u>20%</u> (138)	—	—	—

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		% N (N, тис. кл/дм ³)		% B (B, г/м ³)		% N (N, тис. кл/10 см ²)		% B (B, мг/10 см ²)	
		Д	С	Д	С	Д	С	Д	С
<i>Microcystis pulverea</i>	1	<u>12–79%</u> (370) (30702)	<u>7%</u> (6358)	–	<u>7–9%</u> (0,115) (0,430)	<u>25–51%</u> (1760) (10525)	–	<u>17%</u> (0,279)	–
	2	<u>19%</u> (235)	–	–	–	–	<u>7–8%</u> (1034) (340)	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Microcystis wesenbergii</i>	1	<u>15–71%</u> (1980) (63616)	–	<u>14–68%</u> (0,294) (7,189)	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	<u>5%</u> (200)	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Oscillatoria tenuis</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	<u>30–41%</u> (680) (1190)	<u>8%</u> (99)	<u>15–19%</u> (0,025) (0,170)	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Planktothrix agardhii</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	<u>21%</u> (576)	<u>6%</u> (136)	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Potamolinea aerugineocaerulea</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	<u>10%</u> (18)	<u>6%</u> (36)	–	–	–	–	–	–
<i>Pseudanabaena mucicola</i>	1	<u>24%</u> (3710)	<u>7–9%</u> (1080) (250)	–	–	–	–	–	–
	2	–	<u>6%</u> (70)	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		<u>% N</u> (N, тис. кл/дм ³)		<u>% B</u> (B, г/м ³)		<u>% N</u> (N, тис. кл/10 см ²)		<u>% B</u> (B, мг/10 см ²)	
		<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>
<i>Rhabdoderma lineare</i>	1	<u>23%</u> (3876)	<u>7%</u> (3000)	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Amphora libyca</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	<u>8%</u> (0,068)	—	—	—	<u>7%</u> (0,180)
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Amphora ovalis</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	<u>8%</u> (0,068)	—	—	—	<u>6%</u> (0,109)
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Aulacoseira ambigua</i>	1	—	—	—	<u>7%</u> (0,086)	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Aulacoseira distans</i>	1	—	—	—	<u>5–6%</u> (0,028) (0,291)	—	—	—	—
	2	—	<u>6–8%</u> (73) (211)	—	<u>8%</u> (0,013)	—	—	—	<u>7–8%</u> (27) (44)
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Aulacoseira granulata</i>	1	—	—	—	<u>7%</u> (0,088)	—	—	—	—
	2	—	<u>6%</u> (168)	<u>10%</u> (0,135)	—	<u>13%</u> (73)	<u>8%</u> (32)	<u>13%</u> (0,058)	<u>5–9%</u> (0,027) (0,025)
	3	—	—	—	—	—	—	—	—

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		<u>% N</u> (N, тис. кл/дм ³)		<u>% B</u> (B, г/м ³)		<u>% N</u> (N, тис. кл/10 см ²)		<u>% B</u> (B, мг/10 см ²)	
		<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>
<i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>	1	–	<u>5%</u> (698)	<u>13%</u> (0,205)	<u>7%</u> (0,071)	<u>33–53%</u> (6800) (3960)	<u>8%</u> (572)	<u>12–53%</u> (0,202) (1,164)	<u>6%</u> (0,168)
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Aulacoseira italica</i>	1	–	–	<u>12%</u> (0,111)	–	–	–	–	–
	2	–	–	<u>14%</u> (0,022)	–	<u>12%</u> (48)	<u>9%</u> (51)	–	<u>6–8%</u> (0,026) (0,024)
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Cocconeis placentula</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	<u>24–31%</u> (41) (18)	<u>5%</u> (30)	<u>27–36%</u> (0,042) (0,018)	–	<u>16–70%</u> (8) (266)	<u>7%</u> (48)	<u>10–81%</u> (0,008) (0,269)	–
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	<u>7–8%</u> (0,067) (0,144)	–	–	–	–
	3	<u>24%</u> (41)	<u>5%</u> (30)	<u>11–54%</u> (0,006) (0,083)	–	–	–	–	–
<i>Cyclostephanos dubius</i>	1	–	–	–	–	–	<u>6%</u> (396)	<u>14%</u> (0,396)	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		<u>% N</u> (N, тис. кл/дм ³)		<u>% B</u> (B, г/м ³)		<u>% N</u> (N, тис. кл/10 см ²)		<u>% B</u> (B, мг/10 см ²)	
		<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>
<i>Cyclotella sp.</i> (10,48 мкм)	1	—	—	—	—	—	—	—	8% (0,095)
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Cymbella lanceolata</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	5% (0,060)	—	—	—	7% (0,175)
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Cymbella tumida</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	5% (0,081)	—	—	—	—
	3	35% (210)	—	50% (0,835)	6% (0,003)	—	6% (43)	14% (0,171)	—
<i>Discostella stelligera</i>	1	—	—	10% (0,159)	5% (0,071)	—	—	15% (0,248)	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Epithemia turgida</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	6% (0,109)	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Fragilaria crotonensis</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	8% (4)	—	—

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		% N (N, тис. кл/дм ³)		% B (B, г/м ³)		% N (N, тис. кл/10 см ²)		% B (B, мг/10 см ²)	
		Д	С	Д	С	Д	С	Д	С
<i>Fragilaria rumpens</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	<u>7%</u> (4)	–	–
<i>Fragilaria vaucheriae</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	<u>7%</u> (4)	–	–	<u>19%</u> (16)	–	–	<u>7%</u> (0,008)
<i>Fragilariforma virescens</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	<u>9%</u> (248)	–	<u>5%</u> (0,071)	<u>10–22%</u> (1377) (128)	<u>9%</u> (34)	<u>23%</u> (0,395)	<u>8%</u> (0,037)
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lindavia bodanica</i>	1	–	–	–	–	–	<u>8%</u> (0,139)	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Melosira varians</i>	1	–	–	<u>10–49%</u> (0,173) (0,381)	–	–	–	–	–
	2	–	<u>5%</u> (143)	<u>18–29%</u> (0,415) (0,494)	–	–	–	<u>10–30%</u> (0,250) (0,365)	–
	3	<u>10%</u> (60)	<u>5%</u> (3)	<u>12–19%</u> (0,208) (0,010)	–	<u>15–28%</u> (13) (14)	<u>9%</u> (60)	<u>17–60%</u> (0,208) (0,048)	–
<i>Navicula cryptocephala</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	<u>7%</u> (3)	–	–

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		<u>% N</u> (N, тис. кл/дм ³)		<u>% B</u> (B, г/м ³)		<u>% N</u> (N, тис. кл/10 см ²)		<u>% B</u> (B, мг/10 см ²)	
		<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>
<i>Navicula reinhardtii</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	<u>6%</u> (0,051)	—	—	<u>22%</u> (0,575)	—
	3	—	—	—	<u>7%</u> (0,0004)	—	—	—	<u>7%</u> (0,008)
<i>Navicula tripunctata</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	<u>5%</u> (180)	—	<u>6–7%</u> (0,033) (0,180)
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Nitzschia sigmoidea</i>	1	—	—	<u>16%</u> (0,214)	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Nitzschia vermicularis</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	<u>7–8%</u> (0,088) (0,070)	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Pinnularia viridis</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	<u>9%</u> (0,122)	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Pseudostaurosira brevistriata</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	<u>6%</u> (136)	—	—	—	<u>5–7%</u> (204) (918)	<u>15%</u> (0,364)	<u>5%</u> (0,059)
	3	—	—	—	—	—	—	—	—

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		<u>% N</u> (N, тис. кл/дм ³)		<u>% B</u> (B, г/м ³)		<u>% N</u> (N, тис. кл/10 см ²)		<u>% B</u> (B, мг/10 см ²)	
		<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>
<i>Rhoicosphenia abbreviata</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	5% (0,027)
	3	–	–	–	–	10% (37)	–	–	9% (0,029)
<i>Skeletonema potamos</i>	1	12% (320)	5% (750)	–	6% (0,031)	14% (1120)	–	–	9% (0,104)
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Staurosira binodis</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	23–24% (680) (544)	–	10–15% (0,170) (0,136)	–	21–57% (850) (733)	–	18–31% (0,212) (0,183)	–
	3	–	6% (36)	–	–	–	5% (20)	–	–
<i>Staurosira construens</i>	1	–	–	–	–	11–20% (2175) (1452)	–	14–40% (0,229) (1,599)	5% (0,145)
	2	53% (3599)	–	40% (0,900)	–	13% (167)	–	–	7% (0,122)
	3	–	6% (4)	–	–	–	–	–	–
<i>Staurosirella pinnata</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	5% (748)	–	5% (0,090)
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Stephanocyclus meneghinianus</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	12–16% (66) (63)	–	–	5% (0,015)
	3	–	–	–	–	–	–	–	–

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		<u>% N</u> (N, тис. кл/дм ³)		<u>% B</u> (B, г/м ³)		<u>% N</u> (N, тис. кл/10 см ²)		<u>% B</u> (B, мг/10 см ²)	
		<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>
<i>Stephanodiscus hantzschii</i>	1	–	<u>5%</u> (130)	<u>21–44%</u> (0,263) (0,232)	<u>5–7%</u> (0,086) (0,125)	–	–	<u>11–38%</u> (0,314) (0,450)	<u>8%</u> (0,139)
	2	–	–	<u>15%</u> (0,191)	–	<u>10–14%</u> (56) (54)	–	<u>23–32%</u> (0,100) (0,097)	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Tabellaria fenestrata</i>	1	–	–	<u>10%</u> (0,155)	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Ulnaria oxyrhynchus</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	<u>8%</u> (0,220)
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	<u>17%</u> (114)	–	<u>47%</u> (0,570)	–
<i>Ulnaria ulna</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	<u>7%</u> (0,008)
<i>Ceratium hirundinella</i>	1	–	–	–	<u>6%</u> (0,684)	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		% N (N, тис. кл/дм ³)		% B (B, г/м ³)		% N (N, тис. кл/10 см ²)		% B (B, мг/10 см ²)	
		Д	С	Д	С	Д	С	Д	С
<i>Peridinium cinctum</i>	1	–	–	<u>11–42%</u> (0,308) (1,954)	–	–	–	–	<u>7%</u> (0,157)
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Ochromonas mutabilis</i>	1	–	–	–	–	–	<u>7%</u> (588)	–	<u>5%</u> (0,056)
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Chlamydomonas globosa</i>	1	–	–	–	<u>6%</u> (0,081)	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Chlamydomonas reinhardtii</i>	1	–	–	–	<u>6%</u> (0,115)	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Closterium cornu</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	<u>5%</u> (0,024)
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Coenococcus planctonicus</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	<u>7%</u> (50)	–	–
<i>Desmodesmus communis</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	<u>7%</u> (27)	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		<u>% N</u> (N, тис. кл/дм ³)		<u>% B</u> (B, г/м ³)		<u>% N</u> (N, тис. кл/10 см ²)		<u>% B</u> (B, мг/10 см ²)	
		<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>
<i>Microglena monadina</i>	1	–	–	<u>12–15%</u> (0,196) (0,082)	–	–	–	<u>26%</u> (0,720)	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Oedogonium sp.</i> (10/40 мкм)	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	<u>6%</u> (0,069)
<i>Pediastrum duplex</i>	1	<u>19%</u> (800)	<u>5%</u> (160)	<u>20%</u> (0,259)	<u>6–7%</u> (0,165) (0,052)	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	<u>20%</u> (11)	–	–	<u>7%</u> (0,004)	–	–	–	–
<i>Pseudopediastrum boryanum</i>	1	–	–	–	<u>9%</u> (0,047)	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	<u>7%</u> (27)	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pteromonas torta</i>	1	–	–	<u>12%</u> (0,223)	<u>7%</u> (0,065)	–	–	<u>13%</u> (0,156)	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Scenedesmus ellipticus</i>	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	<u>10%</u> (6)	–	–	–	–	–	–	–

Види*	Екологічна група	Лотичні біотопи				Лентичні біотопи			
		<u>% N</u> (N, тис. кл/дм ³)		<u>% B</u> (B, г/м ³)		<u>% N</u> (N, тис. кл/10 см ²)		<u>% B</u> (B, мг/10 см ²)	
		<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>С</i>
<i>Ulothrix sp.</i> (27/16 мкм)	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	<u>7%</u> (0,011)	–	–	–	–
<i>Ulothrix sp.</i> (54/43 мкм)	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	<u>22%</u> (0,376)	–	–	–	–	–

Примітки. Над рискою – частка (%) домінуючого виду в чисельності (біомасі) водоростевих угруповань, під рискою дрібним шрифтом – абсолютна чисельність (N) чи біомаса (B) домінуючого виду, яка відповідає його зазначеній відсотковій частці.

Екологічна група: 1 – фітопланктон; 2 – мікрофітобентос; 3 – фітоепіфітон.

* Автори конкретних видів наведені в «Списку таксономічного різноманіття...» (Shcherbak et al., 2023).

